

Personnr

Navn

Adresse

Innleggelses-
tidspunkt

Dato Måned År Timer Min

Registrering for sykehus som ønsker å kartlegge pasienter som har forbigående akutte fokale utfall (< 24 timer) med positiv bildediagnostikk.

Statin og annen lipidsenkende behandling (Atorvastatin, Atozet, Cholestagel, Crestor, Ezetrol, Inegy, Lescol, Lipitor, Lojuxta, Lovastatin, Praluent, Pravachol, Pravastatin, Repatha, Rosuvastatin Sandoz, Simvastatin, Zocor)

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Medikamentell behandling for høyt blodtrykk (kalsiumblokkere, ACE-hemmere, A2 (angiotensin), betablokkere, og diuretika)

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Risikofaktorer

Tidligere hjerneslag?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Tidligere TIA?

Opplysninger om sikre tegn på TIA i form av klare forbigående fokale utfall

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Tidligere hjerteinfarkt?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Atrieflimmer bekreftet med EKG tidligere eller i løpet av innleggelsen (gjelder også paroxystisk atrieflimmer/flutter)?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Diabetes, tidligere diagnostisert eller nyoppdaget?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Røykestatus

0 Aldri 1 Røyker 2 Eks-røyker (røykfri > 1 mnd) 9 Ukjent

Hvis ja, anfør type hjerneslag

- 1 Infarkt
 2 Blødning
 3 Uspesifisert
 4 Både infarkt og blødning
 9 Ukjent

Hvis ja, når var siste TIA?

- 1 Innen siste uke
 2 Over 1 uke før hjerneslaget

Når ble atrieflimmer oppdaget?

- 1 Atrieflimmer tidligere
 2 Atrieflimmer nyoppdaget ved ankomst til sykehuset eller under innleggelsen

Status i akutfasen

Fokale utfall

Facialisparese

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Beinparese

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Andre nye fokale slagsymptomer

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Armparese

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Språkproblemer (afasi)

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Hvilke fokale symptomer?

- Dysartri
 Ataksi
 Sensibilitetsutfall
 Neglekt
 Dobbeltsyn
 Synsfeltutfall
 Vertigo
 Dysfagi

NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)

Angi totalscore akutt ved innkomst

Ikke utført

Angi totalscore ved 24 timer +/- 12 timer etter innkomst

Ikke utført

Bilddiagnostikk av hjerneslaget

- 1 Ingen 2 CT 3 MRI 4 CT + MRI 5 Annen 9 Ukjent

Medikamentell behandling før debut av forbigående fokale utfall

Medikament (Eksempler)	Ja 1	Nei 2	Ukjent 9
Acetylsalisylsyre (ASA) (Asasantin Retard, Acetylsalisylsyre, Albyl E, Aspirin, Diprasorin)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADP-reseptorblokker (Brilique, Clopidogrel, Efient, Plavix, Ticlid)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dipyridamol (Apanova, Asasantin Retard, Diprasorin, Persantin (Retard))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warfarin (Marevan, Warfarin Orion)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andre perorale antikoagulasjonsmidler enn Warfarin (Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hvilke anti-koagulasjonsmidler?

- Apixaban (f.eks Eliquis) Dabigatran (f.eks Pradaxa)
 Rivaroxaban (f.eks Xarelto) Annet peroralt antikoagulasjonsmiddel