



Personnr

Navn

Adresse

Registrering for sykehus som ønsker å kartlegge pasienter som har forbigående akutte fokale utfall (< 24 timer) med positiv bildediagnostikk.

Risikofaktorer

Tidligere hjerneslag?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Tidligere TIA?

Opplysninger om sikre tegn på TIA i form av klare forbigående fokale utfall

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Tidligere hjerteinfarkt?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Gjennomgått store hjerte-/karintervensjoner?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Atrieflimmer bekreftet med EKG tidligere eller i løpet av innleggelsen (gjelder også paroxystisk atrieflimmer/flutter)?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Diabetes, tidligere diagnostisert eller nyoppdaget?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Røykestatus

0 Aldri 1 Røyker 2 Eks-røyker (røykfri > 1 mnd) 9 Ukjent

Hvis ja, anfør type hjerneslag

- 1 Infarkt
- 2 Blødning
- 3 Uspesifisert
- 4 Både infarkt og blødning
- 9 Ukjent

Hvis ja, når var siste TIA?

- 1 Innen siste uke
- 2 1-4 uker før slaget
- 3 4-12 uker før slaget
- 4 Over 12 uker før slaget

Når ble atrieflimmer oppdaget?

- 1 Atrieflimmer tidligere
- 2 Atrieflimmer nyoppdaget ved ankomst til sykehuset eller under innleggelsen

Status i akutfasen

Fokale utfall

Facialisparese

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Beinparese

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Andre nye fokale slagsymptomer

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Armparese

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Språkproblemer (afasi)

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Hvilke fokale symptomer?

- Dysartri
 Ataksi
 Sensibilitetsutfall
 Neglekt
 Dobbeltsyn
 Synsfeltutfall
 Vertigo

NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)

Angi totalscore akutt ved innkomst

Ikke utført

Angi totalscore ved 24 timer +/- 12 timer etter innkomst

Ikke utført

Medikamentell behandling før debut av forbigående fokale utfall

Medikament (Eksempler)

Ja 1 Nei 2 Ukjent 9

Acetylsalisylsyre (ASA) (Asasantin Retard, Acetylsalisylsyre, Albyl E, Aspirin, Axanum, Diprasorin, Globoid)

ADP-reseptorblokker (Brilique, Clopidogrel, Efient, Plavix, Ticlid)

Dipyridamol (Apanova, Asasantin Retard, Diprasorin, Persantin (Retard))

Warfarin (Marevan)

Andre perorale antikoagulasjonsmidler enn Warfarin (Arixtra, Defitelio, Eliquis, Novastan, Pradaxa, Xarelto)

Hvilke anti-koagulasjonsmidler?

Apixaban (f.eks Eliquis)

Dabigatran (f.eks Pradaxa)

Rivaroxaban (f.eks Xarelto)

Annet peroralt antikoagulasjonsmiddel

Statin og annen lipidsenkende behandling (Atorvastatin, Cholestagel, Crestor, Ezetrol, Inegy, Lescol, Lestid, Lipitor, Lovastatin, Omacor, Pravachol, Pravastatin, Ques-tran, Simvastatin, Sortis, Zocor)

Medikamentell behandling for høyt blodtrykk (kalsiumblokkere, ACE-hemmere, A2 (angiotensin), betablokkere, og diuretika)

Undersøkelser og tiltak utført under oppholdet

Bilediagnostikk av hjerneslaget

1 Ingen 2 CT 3 MRI 4 CT + MRI 5 Annen 9 Ukjent